RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 9 novembre 2026 au 15 novembre 2026

SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)

Influenza aviaire hautement pathogène

- Des cas d'IAHP ont été détectés au **Manitoba** et en **Alberta**, à la suite d'une épidémie liée à une exposition avicole nationale qui s'est tenue le 7 novembre 2026 à **Moose Jaw**, en **Saskatchewan**. Les personnes ayant présenté, acheté ou vendu des oiseaux lors de cet événement, et qui n'ont pas encore été contactées, sont invitées à communiquer immédiatement avec l'ACIA. — *Pour en savoir plus* — 3,5
- Au cours de la dernière semaine, le Canada a confirmé des foyers d'IAHP dans des élevages de volailles commerciaux en **Colombie-Britannique** (3), dans des élevages de volailles non commerciaux en **Saskatchewan** (5), en **Alberta** (4) et au **Manitoba** (1), ainsi que chez des oiseaux non classés comme volailles dans des élevages non commerciaux au **Manitoba** (2) et en **Colombie-Britannique** (1) — *Pour en savoir plus* — 3,0
- Au cours de la dernière semaine, l'USDA a confirmé de nouveaux cas d'IAHP (souche H5N1, clade 2.3.4.4b) chez des bovins laitiers au **Texas** (2) et en **Idaho** (2), ainsi qu'une première détection dans **l'Oregon**, dans le comté de **Morrow**. Le troupeau touché a été soumis à des tests dans le cadre du programme de surveillance de l'IAHP chez les bovins laitiers mis en place par l'Oregon ; les résultats des tests effectués précédemment sur ce troupeau avaient toujours été négatifs. — *Pour en savoir plus* — 3,0
- **L'Oklahoma** a également confirmé récemment un cas d'IAHP dans un troupeau laitier ; il s'agit du premier cas d'infection chez des bovins laitiers signalé dans cet État depuis juillet 2024 — *Pour en savoir plus* — 3,0

Influenza de type A (H5N1)

- Le syndicat des travailleurs agricoles a déclaré que les cas humains de grippe A (H5N1) chez les travailleurs laitiers de la vallée de **Yakima**, dans **l'État de Washington**, sont sous-déclarés, en partie parce que ces travailleurs sont souvent des immigrants, et qu'il y a actuellement une augmentation des contrôles effectués par les services de l'immigration et des douanes des États-Unis dans la vallée de Yakima — *Pour en savoir plus* — 3,0

Virus Shamonda

- Article de revue : *"Detection of Shamonda virus in field-collected Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae), **Switzerland**, August to September 2026"* — *Pour en savoir plus* — 3,0
  - Détection du virus SHAV chez des moucherons piqueurs du genre *Culicoides* : groupe *C. obsoletus* (non distingué au niveau de l'espèce), *C. circumscriptus* et *C. festivipennis*, dans des élevages bovins en **Suisse**, avec une possibilité de transmission verticale du SHAV au sein des *Culicoides*
- Les services vétérinaires de l'APHIS (USDA) restreint l'importation de matériel génétique de ruminants (semence, embryons et tissus destinés au clonage) collecté à partir du 5 juin 2026, en provenance de tous les pays de l'UE, de l'AELE et du Royaume-Uni, en raison de l'émergence du virus Shamonda — *Pour en savoir plus* — 3,0

Rage

- Une mouffette infectée par la rage du raton laveur a mordu une fillette de deux ans dans une garderie à **Granby**, dans les **Cantons-de-l'Est**, au **Québec** ; la fillette a reçu des antibiotiques ainsi que des vaccins et se porte bien — *Pour en savoir plus* — 3,0

NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)

Aucun nouvel événement à signaler cette semaine.

RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 9 novembre 2026 au 15 novembre 2026

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord **Nombre de signaux : 11** **Nombre de semaines dans le rapport : 243** **Évaluation moyenne : 2,0 - 3,5**

• Au cours de la semaine dernière, le Canada a signalé des foyers d'IAHP dans des élevages de volailles commerciaux en Colombie-Britannique (3) ; dans des élevages de volailles non commerciaux en Saskatchewan (5), en Alberta (4) et au Manitoba (1) ; ainsi que chez des oiseaux non classés comme volailles dans des élevages non commerciaux au Manitoba (2) et en Colombie-Britannique (1).
• Des cas d'IAHP ont été détectés au Manitoba et en Alberta à la suite d'un foyer lié à une exposition avicole nationale qui s'est tenue le 7 novembre 2026 à Moose Jaw, en Saskatchewan. Les personnes ayant présenté, acheté ou vendu des oiseaux lors de cet événement et qui n'ont pas encore été contactées sont invitées à communiquer immédiatement avec l'ACIA
• En Ontario, des analyses préliminaires ont permis de détecter le virus de l'IAHP (souche H5) au sein d'un petit élevage familial de volailles dans la région de Halton, où les oiseaux sont morts ; une enquête plus approfondie est en cours.
• Au cours de la semaine dernière, l'USDA a signalé des foyers d'IAHP chez des volailles dans l'Utah (1), ainsi que chez des troupeaux avicoles dans l'Ohio (1), le Montana (1) et le Wisconsin (1)
• En date du 16 novembre 2026, l'USDA avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1233 troupeaux laitiers répartis dans 22 États : Oregon (1), Wisconsin (1), Nebraska (1), Wyoming (1), Caroline du Nord (1), Ohio (1), Indiana(2), Oklahoma (2), Kansas (5), Arizona (5), Dakota du Sud (7), Minnesota (9), Nouveau-Mexique (9), Nevada (11), Iowa (13), Utah (29), Michigan (31), Washington (43), Texas (43), Colorado (64), Idaho (179) et Californie (773); des nouveaux foyers ont été signalés au cours de la semaine écoulée, dans les États suivants : Idaho (2), Oregon (1)
• L'Oregon a signalé ses premiers cas d'IAHP chez des bovins laitiers dans le comté de Morrow. Le troupeau touché a été testé dans le cadre de la surveillance continue de l'IAHP chez les bovins laitiers de l'Oregon, et tous les tests effectués avant la détection du virus étaient négatifs
• L'Oklahoma a également confirmé récemment un cas d'IAHP dans un troupeau laitier ; il s'agit du premier cas d'infection chez les bovins laitiers signalé dans cet État depuis juillet 2024
• L'Association nationale des départements d'agriculture des États et l'Assemblée nationale des responsables de la santé animale des États ont rencontré le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) pour l'exhorter à autoriser un cadre national de vaccination d'urgence volontaire pour les bovins laitiers
• Au Mexique, une épidémie d'IAHP a été signalée au zoo de León, dans l'État de Guanajuato. L'introduction du virus serait liée aux oiseaux migrateurs
• Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site WastewaterSCAN du CDC et de l'Université de Stanford

Influenza de type A(H5N1) aux États-Unis **Nombre de signaux : 01** **Nombre de semaines dans le rapport : 49** **Évaluation moyenne : 3,0**

• Le syndicat des travailleurs agricoles a déclaré que les cas humains de grippe A (H5N1) chez les travailleurs laitiers de la vallée de Yakima, dans l'État de Washington, sont sous-déclarés, en partie parce que ces travailleurs sont souvent des immigrants, et qu'il y a actuellement une forte augmentation des opérations de l'*Immigration and Customs Enforcement* dans la vallée de Yakima

Rage au Canada **Nombre de signaux : 01** **Nombre de semaines dans le rapport : 20** **Évaluation moyenne : 3,0**

• Une mouffette infectée par la rage du raton laveur a mordu une fillette de deux ans dans une garderie à Granby, dans les Cantons-de-l'Est, au Québec; la fillette a reçu des antibiotiques ainsi que des vaccins et se porte bien

Virus Shamonda en Europe **Nombre de signaux : 02** **Nombre de semaines dans le rapport : 16** **Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0**

• L'APHIS du département de l'USDA, par l'intermédiaire de ses services vétérinaires, restreint l'importation de matériel génétique de ruminants (semence, embryons et tissus destinés au clonage) collecté à partir du 5 juin 2026, en provenance de tous les pays de l'UE, des pays de l'AELE et du Royaume-Uni, en raison de l'émergence du virus Shamonda
• La France a confirmé des foyers de SHAV-EU dans 58 départements, touchant des bovins dans 54 départements, des ovins dans 4 départements (dont un nouveau, la Meuse), un équidé dans 1 département et un caprin dans 1 département.

Fièvre aphteuse en Afrique **Nombre de signaux : 02** **Nombre de semaines dans le rapport : 03** **Évaluation moyenne : 2,2 - 2,8**

• L'Algérie a confirmé, pour la première fois, la présence du sérotype SAT-1 du virus de la fièvre aphteuse, avec trois foyers détectés chez des bovins à Jijel, Sétif et Tébessa, totalisant 27 cas et deux décès
• La Libye a officiellement signalé six foyers de fièvre aphteuse (sérotype SAT-1) dans l'est du pays : trois à Benghazi, deux dans le Jabal al-Akhdar et un à Saluq

Influenza aviaire hautement pathogène en Europe **Nombre de signaux : 14** **Nombre de semaines dans le rapport : 291** **Évaluation moyenne : 2,0 - 2,8**

• L'Écosse a signalé des cas de grippe aviaire hautement pathogène H5N5 chez des loutres eurasiennes, tandis que des cas continuent d'être détectés chez des oiseaux sauvages et des volailles
• En Europe, des cas de grippe aviaire hautement pathogène H5N1 ont été signalés chez des oiseaux sauvages dans 12 pays : Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Italie, Belgique, Suède, Lituanie, Autriche, Espagne, Estonie, Finlande et Moldavie. Des foyers de grippe aviaire hautement pathogène H5N1 ont été signalés chez des oiseaux en captivité en France et en Allemagne, tandis que des foyers chez des volailles ont été signalés en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en France et au Royaume-Uni. De plus, des cas de grippe aviaire hautement pathogène H5N5 ont été signalés chez des oiseaux sauvages en Islande et en Norvège, et un cas de H5 non sous-typé a été signalé en Islande
• Au Royaume-Uni, le Defra a déclaré une zone de prévention de la grippe aviaire en Angleterre et en Écosse afin de réduire le risque de nouvelles épidémies, obligeant tous les éleveurs d'oiseaux à respecter des mesures de biosécurité strictes

Ebola (virus Bundibugyo) en Afrique de l'Est (RDC, Kenya, Nigeria) **Nombre de signaux : 05** **Nombre de semaines dans le rapport : 19** **Évaluation moyenne : 2,0 - 2,7**

• Au 15 novembre 2026, la RDC a enregistré un total de 11 376 cas confirmés d'Ebola, dont 5 568 décès, répartis dans huit provinces : Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Haut-Uélé, Bas-Uélé, Sud-Ubangi et Nord-Ubangi.
• En RDC, au moins 180 patients ont fui l'hôpital de Kelekele, dans le territoire de Beni, à la suite d'une attaque armée survenue le 6 novembre. Parmi eux figurent des cas suspects d'Ebola, ce qui suscite des inquiétudes quant au suivi des patients et à une éventuelle propagation de la maladie

Influenza de type A(H9N2) en Chine **Nombre de signaux : 01** **Nombre de semaines dans le rapport : 91** **Évaluation moyenne : 2,6**

• La Chine a signalé six cas humains de grippe aviaire A(H9N2) depuis le 19 octobre, portant le total à 23 cas au cours des six derniers mois ; parmi ces six cas récents, quatre concernaient des enfants et deux, des personnes âgées

RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 9 novembre 2026 au 15 novembre 2026

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

Myiase à Cochliomyia hominivorax aux États-Unis — **Nombre de signaux : 07** — **Nombre de semaines dans le rapport : 23** — **Évaluation moyenne : 2,0 - 2,6**

• Au 16 novembre 2026, l'USDA a confirmé un total de 142 cas de MCH chez des animaux dans trois États : le Texas (91), le Nouveau-Mexique (44) et l'Arizona (7) ; par ailleurs, 7 détections par pièges à mouches ont été signalées au Texas (4) et au Nouveau-Mexique (3)
• Au Texas, les responsables de la gestion de la faune sauvage profitent de la saison de chasse pour recueillir des données de surveillance sur les infestations par la MCH chez les cerfs sauvages, afin d'évaluer la propagation du parasite au sein des populations d'animaux sauvages
• L'Université de l'Arizona met à disposition des kits de dépistage de la MCH dans la quasi-totalité des centres du réseau *Cooperative Extension*
• À partir de ce mois-ci, l'USDA entamera le recrutement pour 228 postes au sein de l'installation de production de mouches stériles (destinées à lutter contre la MCH) située à Edinburg, au Texas

Maladie débilitante chronique aux États-Unis — **Nombre de signaux : 02** — **Nombre de semaines dans le rapport : 29** — **Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5**

• L'État de New York a confirmé un cas de MDC chez un cerf de Virginie sauvage dans le comté de Livingston. Il s'agit du premier cas détecté chez un cerf sauvage dans l'État depuis 2005, ce qui a entraîné la mise en place de tests obligatoires et d'une zone de confinement couvrant six municipalités
• Le Wisconsin a signalé un cas de MDC dans un élevage de cerfs du comté de Taylor, ce qui a entraîné de nouvelles restrictions concernant l'appâtage et l'alimentation des cerfs dans le comté de Taylor et les comtés environnants

Virus de la fièvre catarrhale du mouton en Europe — **Nombre de signaux : 01** — **Nombre de semaines dans le rapport : 32** — **Évaluation moyenne : 2,4**

• L'Irlande a enregistré une augmentation de 42 % des cas de FCM au cours de la semaine écoulée, portant le nombre total de cas à 88 (82 chez les bovins, 6 chez les ovins)
• Au 13 novembre, le Royaume-Uni a rapporté 3 519 cas de FCM (sérotype 3 ou sérotype non précisé) pour la saison en cours : 2 950 cas en Angleterre, 512 au pays de Galles, 57 en Écosse et 0 en Irlande du Nord
• Ailleurs en Europe, au cours de la semaine écoulée, l'activité liée à la FCM a concerné : le sérotype 3 en Espagne (2), en France (1), en Pologne (2) et en Andorre (1) ; le sérotype 4 en Espagne (2) et à Chypre (1) ; et le sérotype 8 en Espagne (1) et en France (1). L'Espagne a rapporté des cas relevant de ces trois sérotypes

Pseudorage en Amérique du Sud — **Nombre de signaux : 01** — **Nombre de semaines dans le rapport : 02** — **Évaluation moyenne : 2,4**

• L'Argentine a fait état d'une augmentation des cas de maladie d'Aujeszky chez les porcins, avec une évolution passant de petits élevages isolés à des exploitations de plus grande envergure susceptibles de jouer le rôle de « super-propagateurs » ; les autorités attribuent une grande partie de la hausse observée en 2026 à une surveillance accrue, dans le cadre du nouveau plan national de lutte et d'éradication

Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Sud — **Nombre de signaux : 03** — **Nombre de semaines dans le rapport : 129** — **Évaluation moyenne : 2,0 - 2,3**

• La Colombie et le Pérou ont signalé des foyers d'IAHP H5N1 chez les oiseaux de basse-cour
• L'IAHP H5N1 a provoqué une mortalité massive chez les oiseaux et les mammifères sauvages, notamment plus de 53 000 éléphants de mer femelles décédées en Géorgie du Sud en 2025, avec plus de 90 % de mortalité chez les nouveau-nés dans certaines colonies de l'Atlantique Sud. La Liste rouge de l'UICN a par conséquent reclassé les éléphants de mer du Sud, les faisant passer de la catégorie « préoccupation mineure » à la catégorie « vulnérable ». Il s'agit de la première espèce dont le risque d'extinction a été explicitement augmenté en raison de l'IAHP H5N1

Influenza aviaire hautement pathogène en Asie — **Nombre de signaux : 11** — **Nombre de semaines dans le rapport : 253** — **Évaluation moyenne : 2,0**

• Le Japon a signalé des cas d'IAHP chez des oiseaux sauvages et des volailles domestiques
• La Chine a signalé la présence du virus H5 de l'IAHP dans deux échantillons environnementaux prélevés dans la réserve naturelle de Mai Po
• Taïwan a confirmé la présence du virus H5N1 de l'IAHP dans un élevage de cailles du canton de Yanpu, dans le comté de Pingtung, suite à une mortalité anormale ayant entraîné l'abattage de 48 977 cailles
• La Corée du Sud a confirmé trois foyers d'IAHP dans des élevages de volailles en quatre jours : le virus H5N9 dans des élevages de poules pondeuses et de canards, et le virus H5N1 dans un autre élevage de poules pondeuses. Six cas de virus H5 ont également été détectés chez des oiseaux sauvages
• L'Inde a signalé la présence du virus H5N1 de l'IAHP chez des oiseaux en captivité au parc zoologique Arignar Anna, ainsi que dans des élevages de volailles commerciales de l'Andhra Pradesh

Influenza aviaire hautement pathogène en Océanie — **Nombre de signaux : 01** — **Nombre de semaines dans le rapport : 22** — **Évaluation moyenne : 2,0**

• Au 16 novembre 2026, l'Australie a confirmé 742 cas d'IAHP de sous-type H5 chez la faune sauvage : 10 en Australie-Occidentale, 343 en Australie-Méridionale, 83 en Nouvelle-Galles du Sud, 2 dans le Queensland, 249 dans l'État de Victoria, 53 en Tasmanie et 1 dans d'autres territoires (baie de Jervis)
• La Nouvelle-Zélande n'a signalé aucune nouvelle détection d'IAHP au cours de la semaine écoulée

RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 9 novembre 2026 au 15 novembre 2026

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Peste porcine africaine

- *"Sampling intensity and African swine fever detection in South Korean wild boars: a nationwide longitudinal surveillance analysis, 2019–2025"* Pour en savoir plus

Coronavirus

- WHO DON – Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) – Qatar Pour en savoir plus

Fièvre aphteuse

- "Unvaccinated Goats as Sentinel Animals for foot-and-mouth disease virus surveillance at the Wildlife– Livestock Interface: Serological and Molecular Evidence" Pour en savoir plus

Influenza

- *"Highly pathogenic avian influenza in Canada: Spatial analysis of ecological hot and cold spots and environmental drivers"* Pour en savoir plus
- *"pH-based inactivation of highly pathogenic H5N1 virus in unpasteurized milk"* Pour en savoir plus
- *"Cross-Protection against Influenza A(H5) Clade 2.3.4.4b Viruses after A(H1N1) pdm09 Infection"* Pour en savoir plus
- *"Rare recovery of reassortants between contemporary clade 2.3.4.4b H5N1 viruses and human influenza A viruses in vitro"* Pour en savoir plus
- *"Emergence of a Distinct Evolutionary Cluster of Clade 2.3.4.4b H5 Viruses in China during 2024-2025 with Rapid Evolution and Antigenic Divergence"* Pour en savoir plus
- *"The H5N1 avian influenza threat: a European Perspective on Research Gaps and State of Preparedness"* Pour en savoir plus
- *"Highly pathogenic avian influenza virus H5N1 infection in stranded porpoises and dolphins in Chile"* Pour en savoir plus
- *"Environmental Contamination and Rapid Evolution of H9N2 Avian Influenza Virus in Live Bird Markets, South Korea, 2023–2025: Implications for Zoonotic Risk"* Pour en savoir plus
- *"Autoantibodies against Type I Interferons and Death from H7N7 Avian Influenza"* Pour en savoir plus

Myiase a Cochliomyia hominivorax

- *"New World screwworm genomics: implications for past, present, and future control strategies"* Pour en savoir plus

Virus Shamonda

- *"Detection of Shamonda virus in field-collected Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae), Switzerland, August to September 2026"* Pour en savoir plus

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- *"Persistence of viral full-length genomic RNA and replication-associated RNA transcripts and proteins in sheep tissues following acute Crimean-Congo hemorrhagic fever virus infection"* Pour en savoir plus
- *"Alpha-Gal Syndrome Symptom Profiles and Diagnostic Experiences Among Farmers and Ranchers"* Pour en savoir plus

Autres

- *"Wild Boar and Red Deer as Key Players in Coxiella Burnetii Circulation in the Wildlife–Livestock–Human Interface: Serological Analysis Using a Gaussian Mixture Model"* Pour en savoir plus
- *"Emerging Protoparvovirus in Pigs and Wildlife, Denmark"* Pour en savoir plus
- Pre-impression : *"First Detection of Amdoparvovirus carnivoran3 in a Clinically Ill Domestic Dog in Croatia, with Retrospective Molecular Screening"* Pour en savoir plus
- *"Natural Infection of Domestic Dogs with Raccoon Dog and Fox Amdoparvovirus During a Severe Disease Outbreak"* Pour en savoir plus
- Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 11/12/2026 Pour en savoir plus
- France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoosanitaire internationale 17/11/2026 Pour en savoir plus
- Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers Pour en savoir plus

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.