
RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 16 novembre 2026 au 22 novembre 2026


SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)

Influenza aviaire hautement pathogène


- La CFIA a détecté 11 cas d'IAHP dans les trois provinces des Prairies liés au Salon national canadien de la volaille qui s'est tenu en Saskatchewan le 7 novembre 2026 : cinq en **Saskatchewan**, quatre en **Alberta** et deux au **Manitoba** ; l'enquête est en cours, et les personnes qui ont amené de la volaille à l'événement, ou qui ont acheté ou vendu de la volaille là-bas, sont considérées comme des contacts à haut risque et sont en quarantaine. *Pour en savoir plus*



- Au cours de la dernière semaine, le **Canada** a confirmé des foyers d'IAHP chez de la volaille non commerciale en : **Saskatchewan** (4) et **Alberta** (1) ; chez de la volaille commerciale dans : **Alberta** (1), **Colombie-Britannique** (1) et **Québec** (1) *Pour en savoir plus*




- Le **Japon** a annoncé que les deux premières épidémies aviaires de 2026-2027 sont le virus HPAI H5N9 à Kameoka, dans la préfecture de Kyoto, et à Asahi, dans la préfecture de Chiba; ceci pourrait représenter la première détection de ce sous-type auparavant rarement signalé dans le pays. *Pour en savoir plus*




Influenza de type A (H5N1)

- L'Autorité de santé de **l'Oregon** a confirmé le premier cas humain de grippe aviaire A (H5N1) en 2026 dans l'État, lié à un foyer connu d dans une ferme laitière du comté de Morrow ; la personne concernée a été rapidement traitée avec des antiviraux et n'a pas eu besoin d'être hospitalisée. *Pour en savoir plus*




Myiase à Cochliomyia hominivorax (NWS)

- En date du 23 novembre 2026, l'USDA a confirmé un total de 165 cas d'animaux atteints de myiase (NWS) dans trois États : **Texas** (110), **Nouveau-Mexique** (46) et **Arizona** (9, avec un premier cas le bétail) ; un total de 7 détections dans des pièges à mouches a été signalé au Texas (4) et au Nouveau-Mexique (3) *Pour en savoir plus*




Virus Shamonda

- Prépublication : Détection du variant Shamonda Virus EU1 chez des bovins malades, Grèce, 2026
  - Première détection signalée du variant SHAV-EU1 chez des vaches laitières dans la **région de Macédoine Centrale** en **Grèce** ; presque toutes les vaches en lactation et 20-25 % des autres animaux (y compris les jeunes veaux et les génisses) ont été touchés dans l'exploitation laitière, avec un début estimé des symptômes au niveau du troupeau le 7 octobre 2026 *Pour en savoir plus*



Maladie hémorragique du lapin

- Le gouvernement de **l'Alberta** surveille une épidémie sans précédent de MHL chez les lièvres indigènes, l'épidémie a été confirmée en Alberta cet automne, après qu'un trappeur dans le nord-ouest de la province ait signalé la mort de lièvres des neiges indigènes en ce qui semblait être un nombre assez important sur une zone assez vaste ; pendant cette même période, des zones voisines dans **le nord de la Colombie-Britannique** et les **Territoires du Nord-Ouest** ont reçu des rapports similaires de décès massifs de lapins et de lièvres. *Pour en savoir plus*



RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 16 novembre 2026 au 22 novembre 2026

NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



Virus Shamonda Europe-1 chez les bovins en Grèce

Agent pathogène : virus **; Transmission :** vecteur - *culicoides* **; Espèces concernées :** bovins

ⓘ La Grèce a signalé sa première détection du variant SHAV-EU1 chez les bovins laitiers dans la région de Macédoine centrale ; presque toutes les vaches en lactation ont été touchées sur une période de 15 jours et 20 à 25 % des autres animaux (y compris les jeunes veaux et les génisses) ont été affectés dans la ferme laitière, avec un début estimé des symptômes au niveau du troupeau le 7 octobre 2026. La production de lait a diminué d'environ 30 à 40 % pendant la période de symptômes, avec un retour à peu près aux niveaux précédents vingt jours après l'apparition des symptômes au niveau du troupeau, tandis que les effets sur la reproduction comprenaient une augmentation des retours en œstrus (suggérant des pertes embryonnaires précoces, principalement chez les génisses) et huit avortements sur 15 jours à différents stades de gestation (environ 60 à 230 jours) chez les vaches adultes. *Pour en savoir plus*

Évaluation moyenne	2,0-3,0
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	3

Influenza aviaire hautement pathogène (H5N9) chez des volailles au Japon

Agent pathogène : virus **; Transmission :** contact direct, aérosol, fomite **; Espèces concernées :** volailles

ⓘ Le Japon a annoncé que les deux premières épidémies aviaires de 2026-2027 sont dues à l'IAHP H5N9, ce qui pourrait être la première détection de ce sous-type jusque-là rarement signalé dans le pays. Le premier foyer a été confirmé le 12 novembre 2026 dans une ferme avicole de la ville de Kameoka, dans la préfecture de Kyoto, qui abritait environ 200 000 poules pondeuses. Un deuxième foyer a été confirmé le 13 novembre 2026 dans une ferme avicole de la ville d'Asahi, dans la préfecture de Chiba, avec environ 40 000 poules pondeuses devant être abattues.

Pour en savoir plus

Évaluation moyenne	2,0 - 3,0
Nombre de signaux	2
Nombre de notations	4 - 6

Virus de la maladie de Newcastle en Serbie

Agent pathogène : virus **; Transmission :** contact direct, aérosol, fomite **; Espèces concernées :** volailles

ⓘ La Serbie a signalé la première éclosion de maladie de Newcastle (paramyxovirus de type 1 (PMV-1)) chez de la volaille domestique depuis 2007, à Jagodina, Vinorača. *Pour en savoir plus*

Évaluation moyenne	2,5
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	4

Virus de la fièvre catarrhale du mouton sérotype 18 au Mexique

Agent pathogène : virus **; Transmission :** vecteur **; Espèces concernées:** moutons

ⓘ Le Mexique a signalé un foyer de fièvre catarrhale ovine détectée chez des moutons domestiques dans une ferme de l'État de Puebla. La caractérisation virale a identifié le sérotype 18 du virus de la fièvre catarrhale ovine (BTV-18), qui a déjà été documenté sur le continent américain. *Pour en savoir plus*

Évaluation moyenne	2,5
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	4

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord **Nombre de signaux : 09** **Nombre de semaines dans le rapport : 244** **Évaluation moyenne : 2,0 - 4,0**

• Au cours de la dernière semaine, le Canada a signalé des épidémies d'IAHP chez de la volaille non commerciale : en Saskatchewan (4) et en Alberta (1) ; chez de la volaille commerciale : en Alberta (1), en Colombie-Britannique (1) et au Québec (1)

• L'ACIA a détecté 11 cas d'IAHP dans les trois provinces des Prairies liés au Salon national de la volaille canadienne tenu en Saskatchewan le 7 novembre 2026 : cinq en Saskatchewan, quatre en Alberta et deux au Manitoba ; l'enquête est en cours et les personnes ayant apporté de la volaille à l'événement, ou ayant acheté ou vendu de la volaille là-bas, sont considérées à haut risque et sont en quarantaine

• Les responsables de la Colombie-Britannique suivent de près l'épidémie de H5N1 dans l'État de Washington, où des bovins laitiers infectés ont été liés à 3 cas humains et un décès, tout en soulignant que le Canada n'a jamais détecté d'IAHP chez les bovins laitiers et continue de compter sur les tests sur les bovins, la traçabilité et les mesures de biosécurité à la ferme pour prévenir l'introduction

• En date du 9 novembre 2026, les laboratoires de l'ACIA ont testé 12 985 échantillons de lait cru provenant de camions arrivant dans des usines de transformation dans toutes les provinces du Canada. Tous les échantillons se sont révélés négatifs. Les échantillons testés chaque mois comprennent du lait provenant d'environ 2 700 fermes laitières à travers le Canada

• Au cours de la dernière semaine, l'USDA a rapporté des foyers d'IAHP chez de la volaille commerciale : Californie(1), Maryland(1) et Floride(1) ; chez oiseaux non-classés comme de la volaille selon l'OMSA : Washington(2), Oregon(2) et Montana(1) ; et sur un marché d'oiseaux vivants en Californie(1)

• En date du 23 novembre 2026, l'USDA a signalé l'influenza A (H5N1) dans 1234 troupeaux laitiers répartis dans 22 États : Oregon (2), Wisconsin (1), Nebraska (1), Wyoming (1), Caroline du Nord (1), Ohio (1), Indiana (2), Oklahoma (3), Kansas (5), Arizona (5), Dakota du Sud (7), Minnesota (9), Nouveau-Mexique (9), Nevada (11), Iowa (13), Utah (29), Michigan (31), Washington (43), Texas (43), Colorado (65), Idaho (179) et Californie (773) ; un nouveau foyer a été signalé la semaine dernière dans l'Oklahoma (1)

• Le plus grand producteur d'œufs des États-Unis, Cal-Maine Foods, a temporairement arrêté la production dans une installation en Floride et abattu 1,76 million d'oiseaux (dont 1,4 million de poules pondeuses) suite à un foyer d'IAHP

• La vallée de Willamette, dans l'Oregon, connaît une augmentation marquée des détections d'IAHP (H5N1) chez les oiseaux migrateurs aquatiques, avec les niveaux de détection les plus élevés de l'État concentrés près des barrages et des réservoirs

• Le zoo de Louisville, dans le Kentucky, a de nouveau fermé plusieurs enclos d'oiseaux et renforcé les mesures de biosécurité après la mort d'une cigogne blanche d'Europe en captivité due à l'influenza aviaire et l'euthanasie de son compagnon d'enclos suite à la maladie, marquant le premier cas confirmé d'AI dans la collection animale du zoo

• L'IAHP (H5) a été confirmé chez six oiseaux au zoo de León, à Guanajuato, au Mexique, la direction du zoo attribuant le foyer à l'interaction des oiseaux migrateurs avec la faune résidente dans les espaces ouverts et biodiversifiés du parc

• Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site WastewaterSCAN du CDC et de l'Université de Stanford

Influenza de type A(H5N1) aux États-Unis **Nombre de signaux : 01** **Nombre de semaines dans le rapport : 50** **Évaluation moyenne : 3,3**

• L'Autorité Sanitaire de l'Oregon a confirmé le premier cas humain d'IAHP de 2026 dans l'État, lié à un foyer connu dans une ferme laitière du comté de Morrow ; la personne touchée a été rapidement traitée avec des médicaments antiviraux et n'a pas eu besoin d'être hospitalisée

Maladie hémorragique du lapin **Nombre de signaux : 01** **Nombre de semaines dans le rapport : 08** **Évaluation moyenne : 3,0**

• Une épidémie sans précédent de MHL chez les lièvres locaux est surveillée par le gouvernement de l'Alberta, l'épidémie a été confirmée en Alberta cet automne, après qu'un trappeur dans le nord-ouest de la province ait signalé la mort de lièvres des neiges locaux en ce qui semblait être des nombres assez importants sur une assez grande zone ; pendant la même période, des zones voisines du nord de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest ont reçu des rapports similaires de morts massives de lapins et de lièvres

Influenza de type A en Chine **Nombre de signaux : 03** **Nombre de semaines dans le rapport : 92** **Évaluation moyenne : 2,5 - 3,0**

• La Chine a signalé un cas humain du virus de l'influenza A(H9N2) ; il s'agit d'un patient pédiatrique de la province du Hunan, dont les symptômes ont commencé le 20 octobre 2026, qui s'est rétabli, avait été en contact avec des volailles domestiques, et un des échantillons environnementaux a été testé positif pour le virus A(H9)

• La Chine a signalé un cas humain importé d'infection par l'influenza A(H5N1) chez un voyageur de la province de Quang Ninh, au Vietnam, qui a développé des symptômes le 1er novembre ; le cas est guéri et la source de l'infection est indéterminée

Myiase à Cochliomyia hominivorax aux États-Unis **Nombre de signaux : 06** **Nombre de semaines dans le rapport : 24** **Évaluation moyenne : 1,7 - 3,0**

• En date du 23 novembre 2026, l'USDA a confirmé un total de 165 cas de myiase (NWS) chez des animaux dans trois États : Texas (110), Nouveau-Mexique (46) et Arizona (9, avec un premier cas chez le bétail) ; un total de 7 détections dans des piège à mouches ont été signalées au Texas (4) et au Nouveau-Mexique (3)

• Nogales, en Arizona, devrait rouvrir pour l'importation de bétail mexicain le 30 novembre 2026, à condition que les exigences en matière de santé animale, d'inspection et d'infrastructures soient respectées ; l'absence de cas confirmés de NWS dans le comté de Santa Cruz est encourageante, mais l'USDA souligne que les décisions de réouverture dépendent d'une surveillance et de mesures de protection plus larges

• Un professeur assistant à l'Université d'État du Nouveau-Mexique a publié un guide pratique la myiase (NWS) pour sensibiliser à l'épidémie qui se propage rapidement dans le sud-ouest des États-Unis, en mettant l'accent sur les impacts graves du parasite sur le bétail, la faune, les animaux de compagnie et potentiellement les économies agricoles régionales, tout en avertissant que des hivers chauds pourraient faciliter une propagation supplémentaire malgré les efforts en cours de contrôle grâce aux mouches stériles

• Une entreprise au Texas a démontré une utilisation prometteuse de la technologie à faisceau d'électrons pour stériliser les mouches du NWS dans le cadre de la Technique de l'insecte stérile, ce qui pourrait remplacer les méthodes radioactives par une approche plus rapide, plus sûre et plus facilement extensible, pouvant renforcer les efforts de contrôle de l'épidémie

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

La stomatite vésiculaire (VSV) aux États-Unis **Nombre de signaux : 02** **Nombre de semaines dans le rapport : 27** **Évaluation moyenne : 2,8**

• L'APHIS du USDA a confirmé un site équin positif à la SV au Nouveau-Mexique, dans le comté de San Juan (un nouveau comté touché)

Fièvre aphteuse en Afrique **Nombre de signaux : 05** **Nombre de semaines dans le rapport : 04** **Évaluation moyenne : 1,8 - 2,8**

• Le Botswana a confirmé une récidive de la fièvre aphteuse SAT-1 chez les bovins communautaires dans une zone précédemment déclarée indemne par l'OMSA à Robelela ; les cas index se trouvent dans la zone de pâturage près d'une frontière internationale (Zimbabwe)

• Les foyers de fièvre aphteuse SAT1 en Namibie restent confinés à deux zones géographiquement distinctes dans les régions de ǁKharas et du Zambèze

• Le Département de l'Agriculture d'Afrique du Sud a déclaré que la fièvre aphteuse s'est propagée du bétail aux animaux sauvages dans le KwaZulu-Natal et le Limpopo, avec des cas confirmés chez l'antilope rouanne, l'antilopesable, le kudu et le buffle ; plus de 90 % des bovins ont été vaccinés cette année, atteignant l'objectif du gouvernement avec 6 semaines d'avance

Pseudorage en Amérique du Sud **Nombre de signaux : 01** **Nombre de semaines dans le rapport : 03** **Évaluation moyenne : 2,5**

• L'Argentine a signalé des cas de la maladie d'Aujeszky chez les porcs dans les provinces de Buenos Aires, Córdoba et Santa Fe, y compris dans une ferme à Casilda, avec des cas récents également observés chez des animaux de compagnie à Córdoba, Cañada de Gómez et Santa Fe, liés à la consommation de déchets de porc contaminés

Le virus de la maladie de Newcastle en Amérique du Sud **Nombre de signaux : 02** **Nombre de semaines dans le rapport : 04** **Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5**

• Un cinquième foyer de Newcastle a été confirmé dans une ferme de dindes à Nova Itaberaba, Santa Catarina, Brésil, dans une zone déjà soumise à des restrictions sanitaires

Rage au Canada **Nombre de signaux : 03** **Nombre de semaines dans le rapport : 21** **Évaluation moyenne : 2,0 - 2.4**

• Le Québec a confirmé un deuxième cas de rage du variant du raton laveur chez une vache depuis le début de l'épidémie en 2024

• Un cinquième animal, un raton laveur, infecté par la rage a été détecté au Québec, à Saint-Germain-de-Grantham

• Une chauve-souris infectée par la rage est entrée dans un établissement de soins de longue durée au Québec, à Sorel-Tracy, et a eu un contact étroit avec un résident

Influenza aviaire hautement pathogène en Asie **Nombre de signaux : 09** **Nombre de semaines dans le rapport : 254** **Évaluation moyenne : 1,8 - 2,2**

• La Corée du Sud a déclenché une alerte nationale pour l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), car plusieurs foyers précoces chez les volailles semblent impliquer le sous-type émergent H5N9, qui pourrait représenter 8 des 10 premiers foyers du pays cette saison, suscitant des inquiétudes quant au fait que ce sous-type devient plus répandu qu'en 2025-2026

• L'influenza aviaire H5 a été confirmé dans une ferme de cailles à Gimpo, dans la province de Gyeonggi en Corée du Sud

• L'État du Kerala en Inde prévoit d'abattre des milliers d'oiseaux après que l'influenza aviaire a été confirmé dans deux élevages de volailles ; l'État voisin du Tamil Nadu a également intensifié la surveillance après la confirmation de la présence deH5N1 dans des élevages de volaille dans l'un de ses districts

• Des scientifiques d'un institut gouvernemental basé à Bhopal en Inde ont développé le premier vaccin indigène du pays contre l'IAHP H5N1

Influenza aviaire hautement pathogène en Europe **Nombre de signaux : 4** **Nombre de semaines dans le rapport : 292** **Évaluation moyenne : 2,0**

• A travers l'Europe, l'IAHP H5N1 a été trouvé chez des oiseaux sauvages dans 10 pays : Autriche, Belgique, Finlande, Allemagne, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Norvège et Royaume-Uni. Il y a aussi eu des foyers d'IAHP H5N1 chez des oiseaux en captivité en France et en Lettonie, et chez de la volaille en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège et au Royaume-Uni. De plus, certains cas d'IAHP H5 (non sous-typé) ont été signalés chez des oiseaux sauvages en Lettonie

• L'Irlande du Nord examine un cas possible d'influenza aviaire dans une exploitation avicole commerciale du comté de Tyrone après la mort d'un grand nombre d'oiseaux

• Au Royaume-Uni, le pays de Galles a mis en place une zone de prévention de l'influenza aviaire avec des règles de maintien en bâtiment pour aider à prévenir de nouvelles épidémies

Influenza aviaire hautement pathogène en Océanie **Nombre de signaux : 01** **Nombre de semaines dans le rapport : 23** **Évaluation moyenne : 2,0**

• En date du 23 novembre 2026, l'Australie a confirmé 748 cas d'IAHP H5 dans la faune : 10 en Australie-Occidentale, 347 en Australie-Méridionale, 86 en Nouvelle-Galles du Sud, 2 dans le Queensland, 249 dans l'État de Victoria, 53 en Tasmanie et 1 dans les autres territoires (Baie de Jervis)

• La Nouvelle-Zélande n'a signalé aucune détection supplémentaire d'IAHP au cours de la semaine dernière

• Trois décès inexpliqués de manchots pygmées en bonne santé (kororā) en l'espace d'une semaine dans une colonie vulnérable de Kaikōura, en Nouvelle-Zélande, ont entraîné des tests pour l'IAHP H5N1, suscitant l'inquiétude qu'un résultat positif puisse indiquer un important événement de mortalité de la faune chez une espèce à risque

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Peste porcine africaine

- *''Wild boar-related factors relevant to African swine fever epidemiology, surveillance and control in the European Union"* Pour en savoir plus

Fièvre aphteuse

- *"Phylogenetic analysis of a rare SAT1 foot-and-mouth disease virus incursion in Iran in 2025 reveals genetic association with African lineages and suggests potential transboundary connectivity"* Pour en savoir plus
- *"Long-term immunogenicity and broad cross-neutralizing antibody responses induced by a SAT 2 foot-and-mouth disease vaccine against emerging Middle Eastern and African isolates (2014–2024)"* Pour en savoir plus

Influenza

- *"Evolution of avian influenza H5N1 strain in Nigeria from 2006 to 2023: Insight from phylogeographic and gene pool analyses"* Pour en savoir plus
- *"An air of possibility: a systematic review of windborne transmission of avian influenza virus in poultry"* Pour en savoir plus
- *"Molecular epidemiology of influenza A (H5N6) viruses from human infections in Jiangsu Province, China"* Pour en savoir plus
- *"Severe H9N2 virus infection in a hospitalized patient without recognized poultry exposure: implications for surveillance of unexplained severe pneumonia"* Pour en savoir plus
- *''WOAH calls for heightened vigilance as reported avian influenza outbreaks rise"* Pour en savoir plus

Dermatose nodulaire contagieuse

- *"First outbreak of lumpy skin disease in Catalonia, Spain, 2025-2026"* Pour en savoir plus

Virus Shamonda

- *"Detection of Shamonda Virus EU1 Variant in Diseased Cattle, Greece, 2026"* Pour en savoir plus
- *"Guidance: Shamonda virus (SHAV) disease information note: SHAV in animals"* Pour en savoir plus
- *"What is the significance of the emerging infection "Shamonda virus" in the European context?"* Pour en savoir plus
- *"Emerging Shamonda virus: a new threat to pregnancy?"* Pour en savoir plus

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- *"Emerging vector-borne viral diseases: evolving clinical presentations and new populations at risk"* Pour en savoir plus
- *"Larval exposure to insecticides increases adult susceptibility to bluetongue virus in Culicoides sonorensis Wirth and Jones (Diptera: Ceratopogonidae)"* Pour en savoir plus
- *"The Usutu virus, detected in mosquitoes in Spain: "We need to determine to what extent it may be causing infection cases in humans"* Pour en savoir plus

Autres

- Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 11/19/2026 Pour en savoir plus
- France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoosanitaire internationale 24/11/2026 Pour en savoir plus
- Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers Pour en savoir plus

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.