

SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)


Virus Shamonda-Europe

- ◆ La **France** a signalé le premier cas humain au niveau mondial de Shamonda virus Europe 1 (SHAV-EU1) chez un patient sévèrement immunodéprimé décédé dans un établissement de soins palliatifs à **Lyon**
- ◆ Article scientifiques : “*Fatal encephalitis caused by Shamonda virus Europe 1 (SHAV-EU1) in a patient with a severely weakened immune system, France, 2026*”
 - L’infection est probablement survenue entre la mi-juin et début juillet 2026 ; une transmission par des culicoïdes est considérée comme l’hypothèse la plus probable
 - Une affection neurologique sévère a débuté le 23 septembre, évoluant vers des crises convulsives et un coma ; le patient immunodéprimé est décédé 16 jours plus tard
- ◆ La **République tchèque** a signalé son premier cas de SHAV (clade non précisé) chez un fœtus bovin issu d’un avortement, dans la région de **Tábor**

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus




Influenza aviaire hautement pathogène

- ◆ L’USDA a confirmé la présence d’IAHP H5N1 dans environ 20 troupeaux bovins laitiers supplémentaires dans l’**État de Washington**, portant le nombre total de troupeaux infectés à 27 ; le séquençage génétique du virus détecté dans les deux premières exploitations du comté de **Yakima** indique la présence du génotype B3.13
- ◆ Article scientifiques : “*Preliminary report on H5N1 highly pathogenic avian influenza in Utah mink, August 2026*”
 - L’épizootie d’IAHP H5N1 survenue dans un élevage de visons dans l’Utah impliquait le génotype B3.13, étroitement apparenté à des virus identifiés chez des bovins laitiers au Texas en mai 2026
 - Les données génétiques suggèrent que le génotype B3.13 a circulé sans être détecté parmi les visons pendant plusieurs semaines ; dans ce cas, les 10 virus séquencés présentaient tous la mutation PB1-K388R, une substitution déjà observée lors de l’épizootie d’IAHP H5N1 chez des visons en Espagne en 2022, mais qui est rarement présente chez les hôtes aviaires
- ◆ Au cours de la semaine dernière, le **Canada** a confirmé un foyer d’IAHP chez des volailles non commerciales (1 foyer en **Alberta**) ainsi que dans un troupeau avicole non commerciales (1 foyer en **Alberta**)

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus


Pour en savoir plus



Influenza de type A(H5N1)

- ◆ Les données de séquençage GISAID indiquent que le récent cas humain du virus d’IA H5N1 associé aux bovins laitiers dans l’**État de Washington** impliquait le génotype B3.13, étroitement apparenté aux virus détectés chez les bovins laitiers dans l’**Idaho** et l’**Utah**

Pour en savoir plus




Myiase a Cochliomyia hominivorax

- ◆ L’USDA a confirmé la première détection de la MCH chez des animaux sauvages aux **États-Unis**, plus précisément chez un wapiti dans le comté de **Pecos**, au **Texas** ; l’animal se trouvait dans un domaine de chasse et sa découverte a été signalée après qu’il a été abattu par un chasseur
- ◆ Au 26 octobre 2026, l’USDA a confirmé un total de 66 cas de MCH dans deux États : le **Texas** (55 cas) et le **Nouveau-Mexique** (9 cas). Au cours de la semaine écoulée, de nouveaux cas ont été signalés au **Texas** ainsi que dans plusieurs comtés du sud-ouest du **Nouveau-Mexique** (dont certains sont limitrophes de l’Arizona)

Pour en savoir plus


Pour en savoir plus




Virus Ebola (Bundibugyo)

- ◆ Le 20 octobre 2026, le **Nigeria** a signalé son premier cas d’Ebola chez une personne ayant voyagé en **Ouganda** ; au total, 53 personnes ayant été en contact avec ce cas ont été identifiées à ce jour, et des investigations épidémiologiques complémentaires sont en cours.
- ◆ Au 25 octobre 2026, le **Kenya** a confirmé un total de neuf cas d’Ebola, dont deux décès ; le dernier cas a été signalé le 20 octobre 2026 (il s’agit d’un contact étroit du premier cas) et le deuxième décès a été enregistré le 23 octobre 2026.
- ◆ Au 25 octobre 2026, la **RDC** a rapporté un total de 9 964 cas confirmés d’Ebola, incluant 4 851 décès, répartis dans huit provinces touchées : l’**Ituri**, le **Nord-Kivu**, le **Sud-Kivu**, la **Tshopo**, le **Haut-Uélé**, le **Bas-Uélé**, le **Sud-Ubangi** et le **Nord-Ubangi**

Pour en savoir plus



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



● Virus Shamonda Europe-1 chez l'humain en France

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** vecteur - *culicoides* ; **Espèces concernées :** humain

① La France a rapporté le premier cas documenté d'infection humaine par le SHAV-EU1, chez un patient gravement immunodéprimé, probablement infecté début juillet 2026. L'ARN viral a été détecté dans son sérum le 2 juillet 2026, soit plus de deux mois avant l'apparition des symptômes neurologiques. Le patient a ensuite développé une encéphalite sévère évoluant vers des convulsions et un coma, et est décédé d'une défaillance multiviscérale, incluant une atteinte neuro-invasive. Le SHAV-EU1 a été détecté dans le liquide céphalo-rachidien, avec des charges virales très élevées dans l'ensemble du cerveau et de la moelle épinière après le décès. Un virus viable a été cultivé à partir de tissu du système nerveux central. Des analyses approfondies n'ont identifié aucune autre cause de l'encéphalite. Les auteurs ont noté qu'une immunosuppression profonde a probablement contribué à la gravité inhabituelle et à la dissémination de l'infection ; l'analyse génomique n'a révélé aucune preuve de réassortiment par rapport aux virus SHAV-EU1 animaux.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	2,7 - 4,0
Nombre de signaux	4
Nombre de notations	3 - 4

◆ Virus Shamonda Europe en République tchèque

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** vecteur - *culicoides* ; **Espèces concernées :** bétail

① La République tchèque a signalé sa première détection du virus SHAV — de clade non précisé — au sein d'un troupeau bovin dans la région de Tábor. L'infection a été identifiée chez un fœtus bovin avorté, tandis que certains bovins adultes du troupeau présentaient également des signes cliniques. L'administration vétérinaire d'État tchèque avait instauré, début octobre, un dépistage obligatoire du SHAV — à la suite de détections survenues ailleurs en Europe — ciblant les fœtus avortés ainsi que les veaux mort-nés, non viables ou présentant des anomalies congénitales.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	3,0
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	4

■ Virus Ebola Bundibugyo au Nigeria

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** contact direct, fomit ; **Espèces concernées :** humain

① Le Nigeria a signalé son premier cas de maladie à virus Ebola, souche Bundibugyo ; il s'agit d'une femme arrivée à Abuja après un séjour en Ouganda. Le CDC Afrique cherche à déterminer si elle a pu croiser, le 3 octobre 2026 à l'aéroport international d'Entebbe (Ouganda), le « cas index » à l'origine d'un foyer de neuf cas au Kenya. Ce cas index kényan avait transité par l'Ouganda en provenance de la RDC ; or, rien n'indique que la patiente nigériane se soit rendue en RDC, et l'origine de son infection fait donc l'objet d'une enquête. Le Nigeria a engagé une opération de recherche des personnes contacts, et les autorités ont affirmé que la situation restait sous contrôle.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	3,0
Nombre de signaux	2
Nombre de notations	3 - 4

★ Virus de la maladie de Newcastle au Brésil

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** contact direct, aérosol, fomit ; **Espèces concernées :** volaille

① Le Brésil a confirmé un foyer de maladie de Newcastle dans un élevage de dindes à Nova Itaberaba, dans l'État de Santa Catarina. Ce foyer a été détecté grâce à une surveillance active de routine, malgré l'absence de signes cliniques et de mortalité au sein de l'élevage. Sur les 6 526 dindes présentes, 26 ont été testées positives. Des échantillons ont été prélevés le 21 septembre 2026 et le séquençage a confirmé la présence du virus de la maladie de Newcastle le 18 octobre 2026. L'analyse génétique a révélé un site de clivage de la protéine de fusion virulente et une identité nucléotidique de 97,35 % du gène F avec le paramyxovirus de type 1 du pigeon. L'origine de la contamination fait l'objet d'une enquête.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	2,5 - 2,8
Nombre de signaux	2
Nombre de notations	4

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2.4)

<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord</u>	<u>Nombre de signaux : 13</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 240</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 3,2</u>
<ul style="list-style-type: none"> Au cours de la semaine dernière, le Canada a confirmé un foyer d'IAHP chez des volailles non commerciales (1 foyer en Alberta) Au cours de la semaine dernière, l'USDA a signalé des foyers d'IAHP dans des élevages avicoles commerciaux au Wisconsin (2), en Illinois (1), au Kansas (1), dans le Dakota du Sud (1), dans le Dakota du Nord (1) et au Minnesota (1) ; dans un élevage avicole au Nebraska (1) ; et chez des troupeaux non avicoles au Montana (2) et en Californie (2) L'USDA continue de signaler des cas d'IAHP chez les oiseaux sauvages, avec près de 350 détections en octobre ; de nouveaux cas ont récemment été rapportés chez des oiseaux sauvages en Californie, en Caroline du Sud, dans l'Indiana et au Kentucky En date du 26 octobre 2026, l'USDA avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1211 troupeaux laitiers répartis dans 20 États : Wisconsin (1), Nebraska (1), Wyoming (1), Caroline du Nord (1), Ohio (1), Oklahoma (2), Kansas (5), Arizona (5), Dakota du Sud (7), Minnesota (9), Nouveau-Mexique (9), Nevada (11), Iowa (13), Washington (27), Utah (29), Michigan (31), Texas (41), Colorado (64), Idaho (177) et Californie (773); 20 nouveaux foyers ont été signalés au cours de la semaine écoulée, dans les États suivants : Washington (19) et Texas (1) Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site WastewaterSCAN du CDC et de l'Université de Stanford 			
<u>Virus Shamonda en Europe</u>	<u>Nombre de signaux : 04</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 13</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,3 - 3,0</u>
<ul style="list-style-type: none"> Le Portugal a détecté le virus SHAV-EU chez des bovins à Montijo et dans cinq autres municipalités ; les autorités ont renforcé la surveillance L'Espagne a détecté le SHAV-EU dans des élevages bovins répartis sur neuf provinces : le SHAV-EU1 est présent dans sept provinces, tandis que le SHAV-EU2 a été identifié en Cantabrie et au Guipúzcoa La France a rapporté des pertes importantes en matière de reproduction liées au SHAV-EU dans les départements du Doubs et du Jura ; dans un élevage du Doubs, 70 % des vaches en gestation ont avorté La France a confirmé des foyers de SHAV-EU dans 55 départements, touchant des bovins dans 53 départements (dont un nouveau : les Pyrénées-Atlantiques), des ovins dans 2 départements, ainsi qu'un équidé dans 1 département 			
<u>Influenza de type A(H5N1) aux États-Unis</u>	<u>Nombre de signaux : 03</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 47</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0</u>
<ul style="list-style-type: none"> Les données de séquençage issues de GISAID indiquent que le cas humain récent d'infection par le virus de la grippe A(H5N1) — associé à des bovins laitiers — dans l'État de Washington impliquait le génotype B3.13, étroitement apparenté aux virus détectés chez des bovins laitiers dans l'Idaho et l'Utah Le département de la Santé de l'État de Washington a mis à jour ses recommandations concernant le dépistage et la détermination du sous-type des nouveaux virus grippaux 			
<u>Myiase à Cochliomyia hominivorax aux États-Unis</u>	<u>Nombre de signaux : 06</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 20</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0</u>
<ul style="list-style-type: none"> Au 26 octobre 2026, l'USDA a confirmé un total de 66 cas de MCH dans deux États : le Texas (55 cas) et le Nouveau-Mexique (9 cas). Au cours de la semaine écoulée, des cas supplémentaires ont été signalés au Texas ainsi que dans plusieurs comtés du sud-ouest du Nouveau-Mexique (dont certains sont limitrophes de l'Arizona) L'USDA a confirmé la première détection de MCH chez des animaux sauvages aux États-Unis, sur un wapiti dans le comté de Pecos, au Texas ; l'animal se trouvait dans un domaine de chasse et sa découverte a été signalée après qu'il a été abattu par un chasseur L'APHIS prévoit de reprendre les importations de bovins en provenance du Mexique via deux points d'entrée supplémentaires aux États-Unis : à Columbus (Nouveau-Mexique) le 26 octobre et, sous réserve que les conditions nécessaires à des échanges sécurisés soient réunies, à Nogales (Arizona) le 30 novembre. La reprise des importations de chevaux est quant à elle prévue à Santa Teresa (Nouveau-Mexique) pour le 26 octobre L'USDA utilise des outils de modélisation prédictive afin d'identifier les zones présentant le risque le plus élevé d'implantation et de propagation de la MCH, et pour appuyer les mesures de gestion des risques et de préparation 			
<u>Ebola (virus Bundibugyo) en Afrique de l'Est (RDC, Kenya)</u>	<u>Nombre de signaux : 04</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 16</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0</u>
<ul style="list-style-type: none"> Au 25 octobre 2026, la RDC a enregistré un total de 9 964 cas confirmés d'Ebola, dont 4 851 décès, répartis dans huit provinces touchées : l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, la Tshopo, le Haut-Uélé, le Bas-Uélé, le Sud-Ubangi et le Nord-Ubangi Au 25 octobre 2026, le Kenya a confirmé un total de neuf cas d'Ebola, dont deux décès ; le dernier cas a été signalé le 20 octobre 2026 (il s'agit d'un contact étroit du premier cas) et le deuxième décès a été enregistré le 23 octobre 2026 			
<u>Rage au Canada</u>	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 18</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,5</u>
<ul style="list-style-type: none"> Le Québec a recensé 313 cas de rage du raton laveur en 2026, incluant un troisième chat infecté, confirmé en Montérégie en septembre 			
<u>Maladie hémorragique épizootique et virus de la fièvre catarrhale de mouton aux États-Unis</u>	<u>Nombre de signaux : 03</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 14</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,5</u>
<ul style="list-style-type: none"> Des épidémies simultanées de la MHE et de la FCM entraînent une mortalité importante de la faune sauvage dans plusieurs États américains. La MHE affecte les cerfs et autres ongulés au Wisconsin (plus de 2 300 cerfs malades ou morts signalés), au Dakota du Nord (au moins 350 décès d'ongulés dus à la MHE), au Montana et au Michigan (cerfs, antilopes et bovins touchés par la MHE et la FCM) et à New York (la MHE a été détectée chez les bovins, les ovins et les caprins suggérant une faible exposition du bétail à la maladie). La MHE et la FCM sont tous deux responsables de la mortalité des cerfs au Wyoming et au Dakota du Nord 			
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Sud</u>	<u>Nombre de signaux : 02</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 128</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5</u>
<ul style="list-style-type: none"> Le Pérou a confirmé un nouveau foyer d'IAHP H5N1 dans un élevage commercial de poules pondeuses, dans la province de Piura 			
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Europe</u>	<u>Nombre de signaux : 04</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 288</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0</u>
<ul style="list-style-type: none"> À travers l'Europe, des cas d'IAHP ont été signalés chez des volailles domestiques en Bulgarie (H5N1) et au Royaume-Uni, tandis que des détections chez des oiseaux sauvages ont été rapportées en Belgique, en Allemagne, au Danemark, en Italie, aux Pays-Bas et en Norvège (H5N1) ; par ailleurs, un cas de H5N1 a été détecté chez des oiseaux en captivité en Albanie 			
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Asie</u>	<u>Nombre de signaux : 03</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 250</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0</u>
<ul style="list-style-type: none"> L'Inde a signalé des cas d'IAHP chez les volailles commerciales et les oiseaux de zoo 			
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Océanie</u>	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 19</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0</u>
<ul style="list-style-type: none"> Au 26 octobre 2026, l'Australie a confirmé 723 cas d'IAHP de sous-type H5 chez la faune sauvage : 10 en Australie-Occidentale, 336 en Australie-Méridionale, 75 en Nouvelle-Galles du Sud, 2 dans le Queensland, 246 dans l'État de Victoria, 53 en Tasmanie et 1 dans les autres territoires (baie de Jervis) La Nouvelle-Zélande n'a signalé aucune nouvelle détection d'IAHP au cours de la semaine écoulée 			

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Peste porcine africaine

- ◆ *“Determinants of African swine fever occurrence, persistence and spread across Europe”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Epidemiological modeling of African swine fever in wild boars—A systematic review”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Infectious African Swine Fever Virus in Spray-Dried Porcine Plasma Used as Feed Ingredient, South Korea, 2026”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Environmental distribution of African swine fever virus DNA in pig farm wastewater and Amblyomma javanense ticks in Vietnam”* [Pour en savoir plus](#)

Coronavirus

- ◆ *“First Isolation, Genomic Characterization and Experimental Infection of Bovine Coronavirus from Sheep”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Epidemiology of MERS-CoV in Saudi Arabia, 2012–2025: a nationwide surveillance analysis”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ WHO DON – Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient – Royaume d’Arabie saoudite [Pour en savoir plus](#)

Fièvre aphteuse

- ◆ *“Global resurgence and geographic expansion of SAT1 foot-and-mouth disease: insights from outbreaks in Lesotho, Cyprus and Greece”* [Pour en savoir plus](#)

Influenza

- ◆ *“Preliminary report on H5N1 highly pathogenic avian influenza in Utah mink, August 2026”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Biosecurity risk factors associated with outbreaks of high pathogenicity avian influenza (HPAI) on poultry farms in Lower Saxony (Germany) – A case-control-study”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Alerte de la FAO – Appel au renforcement des mesures de prévention, de surveillance et de préparation face à l’influenza aviaire hautement pathogène en Amérique latine et dans les Caraïbes [Pour en savoir plus](#)

Myiase a Cochliomyia hominivorax

- ◆ Alerte épidémiologique de l’OPS : Myiase causée par **Cochliomyia hominivorax** dans la région des Amériques, 16 octobre 2026 [Pour en savoir plus](#)

Virus Shamonda Europe

- ◆ *“Fatal encephalitis caused by Shamonda virus Europe 1 (SHAV-EU1) in a patient with a severely weakened immune system, France, 2026”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Emergence of Shamonda Orthobunyavirus, Central Europe, 2026”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ OMSA – Virus Shamonda : que sait-on de ses effets sur les animaux ? [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- ◆ *“Seroprevalence of Epizootic Hemorrhagic Disease Virus in Cattle, Sheep, and Goats in New York State From 2022 Through 2025”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Initial detection of Haemaphysalis longicornis (Acari: Ixodidae) in Michigan”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Global prevalence of equine piroplasmiasis: A systematic review and meta-analysis of evidence from 2020 to 2025”* [Pour en savoir plus](#)

Autres

- ◆ Note d’évaluation des menaces – Importation au Kenya et au Nigéria de cas de maladie à virus Ebola causés par le virus Bundibugyo [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 10/22/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 27/10/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.