

SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)


Influenza aviaire hautement pathogène

- ◆ Au cours de la semaine écoulée, le **Canada** a confirmé des foyers d'IAHP dans des élevages avicoles commerciaux au **Manitoba** (3) et en **Alberta** (1)
- ◆ Des dossiers gouvernementaux obtenus par l'Animal Welfare Institute au moyen d'une demande d'accès à l'information auprès du **Utah Department of Agriculture and Food** ont mis en lumière des défis et des lacunes dans les protocoles d'intervention en cas de maladie, ainsi que des risques pour la santé publique. Ces documents indiquent que la poursuite de la propagation du virus pourrait entraîner une perte allant jusqu'à 80 % du cheptel de visons. En outre, le virus de l'IAHP H5N1 détecté chez les visons a été caractérisé comme appartenant au génotype B3.13, lequel est également associé aux éclosions observées chez les bovins laitiers.
- ◆ Article de revue : *Highly Pathogenic Avian Influenza Virus Subtype 5 in Cetaceans, Brazil*
 - Le virus IAHP H5 a été identifié chez des dauphins échoués (classés comme vulnérables ou en voie de disparition) le long des côtes brésiliennes entre 2023 et 2025

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus


Pour en savoir plus



Virus Shamonda-Europe

- ◆ **Jersey** a signalé la présence du virus SHAV-EU2 dans des élevages laitiers (échantillons datant de juillet 2026), confirmant ainsi que le virus est présent dans les **îles Britanniques** et à proximité de la **Grande-Bretagne**


Pour en savoir plus




Myiase à *Cochliomyia hominivorax*

- ◆ L'USDA a confirmé une première détection de MCH par piégeage dans le comté de **Brewster**, au **Texas**, ainsi qu'un cas supplémentaire chez une chèvre dans le comté de **Crockett**, au **Texas**

Pour en savoir plus



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



● Virus Shamonda-Europe à Jersey, îles Britanniques

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** vecteur ; **Espèces concernées :** bétail

① La présence de SHAV-EU a été signalée pour la première fois à Jersey. Une prépublication récente indique que le virus a été détecté dans deux élevages laitiers à la suite d'éclosions survenus en juillet 2026, caractérisés par une baisse de la production laitière, une diarrhée fétide et, dans les cas graves, une incapacité à se relever (décubitus). Le séquençage génomique a révélé que le virus était quasi identique (identité de séquence de 99,7 à 99,9 %) aux souches allemandes SHAV-EU-2 récemment identifiées, ce qui suggère une circulation plus large en Europe occidentale. Les auteurs soulignent qu'il s'agit de la première détection du SHAV dans les îles Britanniques et mettent en évidence le risque d'une propagation régionale plus étendue de ce virus émergent du sérotype Simbu.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	3,0
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	3

■ Virus de la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 12 en Sardaigne (Italie)

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** vecteur ; **Espèces concernées :** bétail, mouton

① L'Italie a signalé les premières détections du sérotype FCM-12 en Sardaigne, marquant ainsi l'apparition d'une nouvelle souche dans le pays/la région. Le foyer a débuté le 8 septembre 2026 et concerne deux exploitations situées à Arborea, dans la province d'Oristano : un troupeau ovin et un élevage bovin. Le FCM-12 avait été détecté précédemment aux Pays-Bas en octobre 2024, ce qui constituait le premier et le seul autre signalement de ce sérotype en Europe. La source de l'introduction est inconnue.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	2,7
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	3

◆ Grippe aviaire H5 au Suriname

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** contact direct, aérosol, fomit ; **Espèces concernées :** volaille

① Le Suriname a détecté le virus de l'influenza aviaire H5 pour la première fois à la suite d'une forte hausse de la mortalité dans un élevage de poulets de chair du district de Wanica, où plus de la moitié des quelque 6 000 poulets auraient péri. Les analyses en laboratoire ont confirmé la présence du virus de l'influenza A (H5), bien que des tests supplémentaires soient en cours pour déterminer le sous-type spécifique ainsi que le degré de pathogénicité (hautement ou faiblement pathogène).

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	2,7
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	3

★ Fièvre aphteuse en Namibie

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** contact direct, aérosol, fomit ; **Espèces concernées :** bétail

① La Namibie a confirmé un foyer de fièvre aphteuse au sein de sa zone indemne de la maladie reconnue par l'OMSA, suite à la détection du virus dans une exploitation commerciale à Karasburg, dans la région de Karas. Le foyer a été identifié lors d'une surveillance de routine après le prélèvement d'échantillons sur 11 bovins présentant des signes cliniques, le 22 septembre 2026 ; le sérotype n'est pas encore connu.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	2,0 - 2,7
Nombre de signaux	3
Nombre de notations	3

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués $\geq 2,4$)

Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord **Nombre de signaux : 06** **Nombre de semaines dans le rapport : 236** **Évaluation moyenne : 2,0 - 3,3**

- Au cours de la semaine écoulée, le [Canada](#) a signalé des foyers d'IAHP dans des élevages avicoles commerciaux au Manitoba (3) et en Alberta (1)
- Au cours de la semaine écoulée, l'[USDA](#) a signalé des cas d'IAHP chez des volailles d'élevage commercial dans le Minnesota (2), chez un troupeau avicole (1) et chez deux (2) troupeaux non-avicole dans le Minnesota et l'[Iowa](#) (1) (un élevage familial multi-espèces dans le comté de Boone)
- Des dossiers gouvernementaux obtenus par l'Animal Welfare Institute au moyen d'une demande d'accès à l'information auprès du [Utah Department of Agriculture and Food](#) ont mis en lumière des défis et des lacunes dans les protocoles d'intervention en cas de maladie, ainsi que des risques pour la santé publique. Ces documents indiquent que la poursuite de la propagation du virus pourrait entraîner une perte allant jusqu'à 80 % du cheptel de visons. En outre, le virus de l'IAHP H5N1 détecté chez les visons a été caractérisé comme appartenant au génotype B3.13, lequel est également associé aux éclosions observées chez les bovins laitiers.
- En date du 28 septembre 2026, l'[USDA](#) avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1177 troupeaux laitiers répartis dans 19 États : Wisconsin (1), Nebraska (1), Wyoming (1), Caroline du Nord (1), Ohio (1), Oklahoma (2), Kansas (4), Arizona (5), Dakota du Sud (7), [Minnesota](#) (9), Nouveau-Mexique (9), Nevada (11), Iowa (13), Utah (29), [Michigan](#) (31), Texas (38), [Colorado](#) (64), Idaho (177) et Californie (773); aucune nouvelle épidémie n'a été signalée au cours de la semaine écoulée
- Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site [WastewaterSCAN](#) du [CDC](#) et de l'Université de Stanford

Virus Shamonda en Europe **Nombre de signaux : 08** **Nombre de semaines dans le rapport : 09** **Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0**

- [Jersey](#) a signalé la présence du SHAV-EU2 dans des élevages laitiers (échantillons datant de juillet 2026), confirmant que le virus est présent dans les îles Britanniques et à proximité de la Grande-Bretagne
- L'[Allemagne](#) avait signalé le SHAV-EU dans un troupeau bovin du district de Suisse saxonne-Monts-Métallifères-de-l'Est
- La [France](#) a confirmé des foyers dans 50 départements, touchant des bovins dans 49 départements (dont deux nouveaux départements : l'Aisne et la Charente) et des ovins dans deux départements (dont un nouveau département : l'Aveyron)

Myiase à *Cochliomyia hominivorax* aux États-Unis **Nombre de signaux : 06** **Nombre de semaines dans le rapport : 16** **Évaluation moyenne : 1,3 - 3,0**

- En date du 28 septembre 2026, l'[USDA](#) a confirmé un total de 51 cas de MCH dans deux États : le Texas (50) et le Nouveau-Mexique (1)
- L'[USDA](#) a également confirmé la première détection d'une MCH dans un piège situé dans le comté de Brewster, au Texas
- La [Géorgie](#) a rétabli des exigences renforcées concernant les déplacements interétatiques pour tous les animaux à sang chaud entrant sur son territoire en provenance de cinq comtés du Nouveau-Mexique, à la suite de la détection de la MCH chez un cheval du comté de Grant (Nouveau-Mexique)

Rage au Canada **Nombre de signaux : 01** **Nombre de semaines dans le rapport : 17** **Évaluation moyenne : 2,7**

- En [Colombie-Britannique](#), la découverte d'une mouffette enrégée près du lac Kootenay a déclenché une alerte de santé publique après que plusieurs personnes ont été potentiellement exposées et ont dû recevoir une prophylaxie post-exposition contre la rage

Influenza aviaire hautement pathogène en Océanie **Nombre de signaux : 01** **Nombre de semaines dans le rapport : 15** **Évaluation moyenne : 2,7**

- En date du 28 septembre 2026, l'[Australie](#) a confirmé 621 cas d'IAHP H5 chez la faune sauvage : 10 en Australie-Occidentale, 321 en Australie-Méridionale, 67 en Nouvelle-Galles du Sud, 2 dans le Queensland, 220 dans le Victoria, 45 en Tasmanie et 1 dans les autres territoires (Jervis Bay)
- La [Nouvelle-Zélande](#) n'a signalé aucune nouvelle détection d'IAHP au cours de la semaine écoulée

Théilériose aux États-Unis **Nombre de signaux : 01** **Nombre de semaines dans le rapport : 07** **Évaluation moyenne : 2,5**

- L'[Iowa](#) a confirmé la présence de *Theileria orientalis* à la suite de la mort soudaine de 17 génisses d'un an ; les enquêteurs ont signalé la présence de milliers de tiques sur les animaux touchés, et les analyses ultérieures ont révélé une infection généralisée au sein du troupeau

Peste porcine africaine en Europe **Nombre de signaux : 08** **Nombre de semaines dans le rapport : 193** **Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5**

- La [Finlande](#) a signalé des cas de PPA à Lappeenranta et a étendu sa [zone de restriction](#) principale le long de la frontière russe après la découverte de nouvelles carcasses de sangliers infectés, portant le nombre total de cas confirmés à 44
- L'[Espagne](#) et l'[Italie](#) ont signalé de nouveaux cas de PPA chez des sangliers
- La [Hongrie](#) et la [Roumanie](#) ont signalé des foyers de PPA chez des porcs domestiques

Influenza aviaire hautement pathogène en Afrique **Nombre de signaux : 01** **Nombre de semaines dans le rapport : 98** **Évaluation moyenne : 2,0**

- Le [Nigéria](#) a signalé un cas d'IAHP H5N1 dans un élevage de volailles commercial à Toro (début août 2026)

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Fièvre aphteuse

- ◆ *“Preparation and evaluation of a monovalent foot and mouth disease vaccine as a rapid response to the emerging serotype SAT1 in Egypt”* [Pour en savoir plus](#)

Influenza

- ◆ Pré-impression : *“Serological Evidence of Widespread Exposure to H5 Avian Influenza Virus in Arctic Foxes in Svalbard, Norway”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Evidence for exposure to and infection with H5 clade 2.3.4.4b highly pathogenic avian influenza viruses among polar bears inhabiting Alaska”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Highly Pathogenic Avian Influenza Virus Subtype 5 in Cetaceans, Brazil”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Genetic Diversity of Clade 2.3.4.4b H5Nx High Pathogenicity Avian Influenza Viruses Detected in Korea During the 2025–2026 Winter Season and Pathogenicity of H5N1 and H5N9 Viruses”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Limited added benefit of seasonal influenza vaccination before A(H5) vaccination in mice and ferrets challenged with A(H5N1)”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Emergence of Novel Highly Pathogenic Avian Influenza Virus A(H5N1) Clade 2.3.4.4b in Commercial Poultry, Bangladesh”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Novel emerging reassortant H6 avian influenza viruses with internal genes from G57 genotype of H9N2 pose potential zoonotic risk”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Reassortment of Highly Pathogenic Avian Influenza as a Driver for Zoonotic Spillover, Asia”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ ECDC – Aperçu de la grippe aviaire : juin–août 2026 [Pour en savoir plus](#)

Myiase a Cochliomyia hominivorax

- ◆ *“Advancing the sterile insect technique for the New World screwworm fly: the case for CRISPR-engineered genetic sexing strains”* [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- ◆ Pré-impression : *“Incursion of European Shamonda virus clade II in dairy cattle on Jersey, Channel Islands”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Pré-impression : *“Shamonda virus infection in sheep and goat: First evidence from Europe”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“A longitudinal study of factors associated with positivity for Theileria orientalis ikeda genotype in suspected cattle, Virginia, USA”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Oya Virus in a Patient with Severe Hepatitis, Enteritis, and Coagulopathy”* [Pour en savoir plus](#)

Autres

- ◆ *“The anthropogenic fingerprint on emerging infectious diseases”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 09/24/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 29/09/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ ECDC - Rapport sur les menaces de maladies transmissibles, 19 - 25 septembre 2026, semaine 39 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.